

ĐỀ THI THỬ THEO ĐỀ**MINH HỌA 2021****Mã đề 687**

(Đề thi có 05 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021**Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN****Môn thi thành phần: HÓA HỌC***Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề***Họ, tên thí sinh:****Số báo danh:**

* Cho biết nguyên tử khói của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở (đktc).

Câu 1: Xà phòng hóa $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là

- A. $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$. B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COONa}$. C. CH_3COONa . D. HCOONa .

Câu 2: Axit nào sau đây là axit béo không no?

- A. Axit stearic. B. Axit axetic. C. Axit acrylic. D. Axit oleic.

Câu 3: Cacbohidrat ở dạng polime là

- A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ D. fructozơ.

Câu 4: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

- A. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$. B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. C. CH_3COOH . D. CH_3NH_2 .

Câu 5: Phân tử khói của valin là

- A. 89. B. 117. C. 146. D. 147.

Câu 6: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

- A. . Poli(vinyl clorua). B. Polisaccarit. C. Protein. D. Nilon-6,6.

Câu 7: Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất vật lý chung của kim loại?

- A. Có ánh kim. B. Tính dẻo. C. Tính cứng. D. Tính dẫn điện.

Câu 8: Kim loại nào sau đây **không** khử được ion Cu_2^+ trong dung dịch CuSO_4 thành Cu?

- A. Al. B. Mg. C. Fe. D. K

Câu 9: Cơ sở của phương pháp điện phân dung dịch là

- A. khử ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao bằng các chất khử như C, CO, H_2 , Al.
B. khử ion kim loại trong dung dịch bằng kim loại có tính khử mạnh như Fe, Zn,
C. khử ion kim loại trong hợp chất nóng chảy bằng dòng điện một chiều.
D. khử ion kim loại trong dung dịch bằng dòng điện một chiều.

Câu 10: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO_4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?

- A. Na. B. Ag. C. Ca. D. Fe.

Câu 11: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch

- A. FeSO_4 . B. AgNO_3 . C. KNO_3 . D. HCl .

Câu 12: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch?

- A. Na. B. Fe. C. Mg. D. Al.

Câu 13: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch NaOH?

- A. Al. B. Mg. C. Fe. D. Cu.

Câu 14: Dung dịch nào sau đây được dùng để xử lý lớp cặn

bám vào ấm đun nước?

- A. Muối ăn. B. Cồn. C. Nước vôi trong. D. Giấm ăn.

Câu 15: Kim loại Al được điều chế trong công nghiệp bằng cách điện phân nóng chảy hợp chất nào sau đây?

- A. Al_2O_3 . B. Al(OH)_3 . C. AlCl_3 . D. NaAlO_2 .

Câu 16: Trong hợp chất FeSO_4 , sắt có số oxi hóa là

- A. +2. B. +3. C. +4. D. + 6.

Câu 17: Oxit nào sau đây là oxit axit?

- A. CaO . B. CrO_3 . C. Na_2O . D. MgO .

Câu 18: Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc khí, có thể dẫn tới tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào sau đây?

- A. H_2 . B. O_3 . C. N_2 . D. CO .

Câu 19: Độ dinh dưỡng của phân lân là

- A. % $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$. B. % P_2O_5 . C. % P. D. % PO_4^{3-} .

Câu 20: Chất nào sau đây thuộc loại hiđrocacbon thơm?

- A. Etan. B. Toluen. C. Isopren. D. Propilen.

Câu 21: Hai este etyl axetat và methyl acrylat không cùng phản ứng với

- A. NaOH . B. HCl . C. H_2SO_4 . D. Br_2 .

Câu 22: Thủy phân hoàn toàn $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ và $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ trong dung dịch NaOH đều thu được

- A. CH_3OH . B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. C. CH_3COONa . D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{COONa}$.

Câu 23: Chất X là chất dinh dưỡng, được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ nhỏ và người ốm.

Trong công nghiệp, X được điều chế bằng cách thủy phân chất Y. Chất Y là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát. Tên gọi của X, Y lần lượt là

- A. Glucozơ và xenlulozơ. B. Saccarozơ và tinh bột.
C. Fructozơ và glucozơ. D. Glucozơ và saccarozơ.

Câu 24: Thực hiện phản ứng thủy phân 3,42 gam saccarozơ trong dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng.

Sau một thời gian, trung hòa axit dư rồi cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO_3 trong NH_3 dư, đun nóng thu được 3,24 gam Ag. Hiệu suất phản ứng thủy phân là

- A. 87,50%. B. 69,27%. C. 62,50%. D. 75,00%.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no, mạch hở X (X có nguyên tử C nhỏ hơn 3) bằng oxi vừa đủ thu được 0,8 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 22,5 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là:

- A. 0,8. B. 0,9. C. 0,85. D. 0,75.

Câu 26: Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp. B. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
C. PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. D. Tơ tằm thuộc loại tơ nhân tạo.

Câu 27: Hòa tan hoàn toàn 5,95 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Zn bằng dung dịch H_2SO_4 loãng thì khối

lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Khối lượng Al và Zn trong hỗn hợp lần lượt là (gam)

- A. 4,05 và 1,9. B. 3,95 và 2,0. C. 2,7 và 3,25. D. 2,95 và 3,0.

Câu 28: Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH dư thu được 0,672 lít khí H_2 (đktc). Giá trị của m là

- A. 0,54. B. 0,27. C. 5,40. D. 2,70.

Câu 29: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(III) clorua?

- A. Đốt cháy dây Fe trong khí Cl_2 . B. Cho Fe dư vào dung dịch FeCl_3 .
C. Cho Fe vào dung dịch HCl . D. Cho Fe vào dung dịch CuCl_2 .

Câu 30: Trong các phản ứng sau phản ứng nào **không** phải phản ứng oxi hóa-khử?

- A. $\text{Fe} + \text{HCl}$. B. $\text{FeCl}_3 + \text{Fe}$. C. $\text{FeS} + \text{HCl}$. D. $\text{Fe} + \text{AgNO}_3$.

Câu 31: Hỗn hợp X gồm 2 triglycerit A và B ($M_A < M_B$; tỉ lệ số mol tương ứng là 2: 3). Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa glicerol và hỗn hợp gồm x gam natri oleat, y gam natri linoleat và z gam natri panmitat, m gam hỗn hợp X tác dụng tối đa với 18,24 gam brom. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 73,128 gam CO_2 và 26,784 gam H_2O . Giá trị của y+z là:

- A. 22,146. B. 21,168. C. 20,268. D. 23,124.

Câu 32: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây:

- Bước 1: Cho 1 ml C_2H_5OH , 1 ml CH_3COOH và vài giọt dung dịch H_2SO_4 đặc vào ống nghiệm.
Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 - 6 phút ở $65 - 70^\circ C$.
Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch $NaCl$ bão hòa vào ống nghiệm.

Phát biểu nào sau đây sai?

- A. H_2SO_4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm.
B. Mục đích chính của việc thêm dung dịch $NaCl$ bão hòa là để lớp este tạo thành nổi lên trên.
C. Ở bước 2, thấy có hơi mùi thơm bay ra.
D. Sau bước 2, trong ống nghiệm không còn C_2H_5OH và CH_3COOH .

Câu 33: Cho các phát biểu sau:

- (a) Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.
(b) Nước ép của quả nho chín có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Trong tơ tằm có các gốc α -amino axit.
(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thường.
(e) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương cho thực phẩm và mỹ phẩm.

Số phát biểu đúng là

- A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm một axit, một este (đều no, đơn chức, mạch hở) và 2 hidrocacbon mạch hở cần vừa đủ 0,28 mol O_2 tạo ra 0,2 mol H_2O . Nếu cho 0,1 mol X vào dung dịch Br_2 dư thì số mol Br_2 phản ứng tối đa là:

- A. 0,04. B. 0,06. C. 0,03. D. 0,08.

Câu 35: Hỗn hợp X gồm propin, buta-1,3-dien và một amin no, đơn chức, mạch hở. Đem đốt cháy hoàn toàn 23,1 gam X cần dùng vừa đúng 2,175 mol O_2 nguyên chất thu được hỗn hợp sản phẩm Y gồm CO_2 , H_2O và khí N_2 . Dẫn toàn bộ Y qua bình chứa dung dịch $NaOH$ đặc dư, khí thoát ra đo được 2,24 lit (ở đktc).

Công thức của amin là

- A. C_2H_7N . B. CH_5N . C. C_3H_9N . D. $C_4H_{11}N$.

Câu 36: Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lit CO_2 (đktc) vào V ml dung dịch chứa $NaOH$ 2,75M và K_2CO_3 1M. cộ cạn dung dịch sau phản ứng ở nhiệt độ thường thu được 64,5 gam chất rắn khan gồm 4 muối. Giá trị của V là
A. 140. B. 200. C. 180. D. 150.

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na_2O , $NaOH$, Na_2CO_3 trong dung dịch axit H_2SO_4 40% (vừa đủ) thu được 8,96 lit hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H_2 bằng 16,75 và dung dịch Y có nồng độ 51,449%.

Cộ cạn Y thu được 170,4 gam muối. Giá trị của m là

- A. 37,2. B. 50,6. C. 23,8. D. 50,4.

Câu 38: Thực hiện các thí nghiệm sau:

- (a) Cho dung dịch $BaCl_2$ vào dung dịch $KHSO_4$.
(b) Cho dung dịch $NaOH$ vào dung dịch $Ca(HCO_3)_2$.
(c) Cho dung dịch NH_3 tới dư vào dung dịch $Fe(NO_3)_3$.
(d) Cho dung dịch $NaOH$ tới dư vào dung dịch $AlCl_3$.
(e) Cho kim loại Cu vào dịch $FeCl_3$ dư.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 39: X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở, Z là ancol no, T là este hai chức, mạch hở được tạo ra bởi Z, Y, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T với 400 ml dung dịch $NaOH$ 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ lệ mol 1:1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam, đồng thời thu được 5,824 lit khí H_2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 0,7 mol O_2 , thu được CO_2 , Na_2CO_3 và 0,4 mol H_2O . Phần trăm khối lượng của T trong hỗn hợp E là
A. 8,88%. B. 26,4%. C. 13,90%. D. 50,82%.

Câu 40: Cho 14,8 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe_3O_4 và $Fe(NO_3)_2$ vào dung dịch chứa 0,3 mol H_2SO_4 đun nóng sau khi kết thúc phản ứng phản ứng thu được 0,02 mol khí NO và dung dịch Y chỉ chứa muối sunfat

(không có muối Fe_2^+). Cho $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư vào Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là?

A. 72,18.

B. 76,98.

C. 92,12.

D. 89,52.

----- HẾT -----